

<14>S-1+CDDP 療法

<対象疾患> 胃癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日) 1・・8・・15・・22・・29・・35
①	ハイドレーション (ex)ソルデム1輸液 500mL/2時間など		点滴静注	↑
②	ポタコールR輸液 パロノセトロン注 0.75mg (アロキシ静注用) デキサメタゾン注 6.6mg	500mL 1瓶 1.5V	点滴静注 2時間	↑
③	アプレピタントカプセル 125mg (イメンドカプセル)	1cap	内服 ④の60~90分前	↑
④	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴静注 3時間	↑
⑤	ハイドレーション (ex)ソルデム1輸液 500mL/2時間など		点滴静注	↑
⑥	TS-1 体表面積 1.25m ² 未満:40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満:50mg/回 1.5m ² 以上:60mg/回	80mg/m ² /回	経口投与 朝夕食後 2日間服用 14日間休薬	↑ (21日間服用 14日間休薬)
⑦	デキサメタゾン錠 4mg	1日2錠(8mg)	内服	↑↑↑(day9-11)
⑧	アプレピタントカプセル 80mg (イメンドカプセル)	1cap	内服 朝食後	↑↑(day9-10)

<投与期間> 5週間毎投薬

<所要時間> 約11時間

<備考>

- シスプラチン投与前後にhydration1000~2000ml(CDDP前後)
セット処方では下記内容でハイドレーションを行っている。
CDDP投与前:ソルデム1輸液500mL/2時間×2本
CDDP投与後:ソルデム1輸液500mL/2時間+ソルデム3A輸液500mL/2時間
- CLcr=50mL/min 以下は慎重投与(試験結果はなし)