

<16>S-1+GEM 療法

<対象疾患> 膵臓癌、進行胆道癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日) 1・・8・・15・・22・・28
①	グラニセトロン注 1mg 生理食塩液	1 A 100mL	点滴静注 30分	↑ ↑
②	ゲムシタビン(GEM) 生理食塩液	1,000mg/m ² 100mL	点滴静注 30分	↑ ↑
①	生理食塩液	50mL	全開 フラッシュ用	↑ ↑
②	TS-1 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>1.25 m²未満 80mg/日</p> <p>1.25 m²以上～1.5 m²未満 100mg/日</p> <p>1.5 m²以上 120mg/日</p> </div> </div>		経口投与 朝夕食後 1 4日間服用 1 4日間休薬	↑ (14日間服用 14日間休薬)

<投与期間>

4週(28日)を1クールとして繰り返す。

2週投薬、2週休薬(最終投与日の21日後に次クール開始可能)。

TS-1は14日投薬、14日休薬。

<所要時間> 約1時間

<備考>

同じレジメンを用いた試験は無し。

ASCO2011 GEST試験ではTS-1を1.25 m²未満 60mg/日、1.25 m²以上～1.5 m²未満 80mg/日、1.5 m²以上 100mg/日で投与、14日間服用・7日間休薬で投与