

## <19>CAP+Cetu 療法

<対象疾患> 大腸癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日) 1...8...15...21
①	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 10mg	5 錠	経口投与 ③の 30 分前	↑ ↑ ↑
②	生理食塩液 デキサメタゾン注 6.6mg	100mL 1V	点滴静注 30 分	↑ ↑ ↑
③	生理食塩液 セツキシマブ(Cetu) 初回のみ 400mg/m <sup>2</sup> 120 分 以後 250mg/m <sup>2</sup> 60 分	250mL	点滴静注 120 分 (初回) 60 分 (2 回目以後)	↑ ↑ ↑
④	生理食塩液	50mL	全開 フラッシュ用	↑ ↑ ↑
⑤	カペシタビン錠 300 mg	2000 mg/m <sup>2</sup> /日	経口投与 朝夕食後	↑ (14 日間服用、7 日間休薬)

<投与期間> Cape は 14 日投薬7日休薬。ただし、Cetu は毎週投薬。

<所要時間> 1 回目は 3 時間、2 回目より漸減。

<備考>

エビデンスなし。

XELOX+Cetu(COIN試験)ならあり。左記のOX休薬状態。