

<32>mFOLFOX6+Pani 療法

<対象疾患> KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日) 1.....14
①	生理食塩液 パニツムマブ	100ml 6mg/kg	点滴静注 60分	↑
②	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デキサメタゾン注 6.6mg	100ml 1A 1V	点滴静注 30分	↑
③	5%ブドウ糖液 レボホリナート(I-LV)	250ml 200mg/m ²	点滴静注 120分 ④と同時に	↑
④	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン(I-OHP)	250ml 85mg/m ²	点滴静注 120分 ③と同時に	↑
⑤	生理食塩液 フルオロウラシル(5-FU)	50ml 400mg/m ²	③終了後 全開で滴下	↑
⑥	フルオロウラシル(5-FU) 生理食塩液 (インフュージョンポンプ使用)	2400mg/m ² (投与量は備考参照)	持続注入 46時間 リザーバー使用	↑
⑦	デキサメタゾン錠 4mg	1日2錠(8mg)	内服	↑↑(day2-3)

<投与期間> 1クール2週間(14日)

<所要時間> 約4時間

<備考> 要 登録(パニツムマブ)

ジフェンヒドラミン(レスタミン錠)は必要に応じて投与
パニツムマブにはフィルター付きルートを使用