

<33>FP療法

<対象疾患> 食道癌

<治療レジメン詳細>

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 (点滴時間) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|----|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 28 | | | |
| ① | ハイドレーション | 1000ml | (主管) 点滴静注 | ↑ | | | | | | | | | | |
| ② | アプレピタントカプセル 125mg (イメンドカプセル) | 1cap | 内服 ④の 60~90 分前 | ↑ | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 アロキシ静注 0.75mg デキサメタゾン注 6.6mg | 100ml 1V 1.5V | (主管) 点滴静注 30分 | ↑ | | | | | | | | | | |
| ④ | シスプラチン 生理食塩液 | 60mg/m ² 500ml | (主管) 点滴静注 2時間 | ↑ | | | | | | | | | | |
| ⑤ | ソルデム 3A フルオロウラシル(5-FU) | 1000ml 800mg/m ² | (主管) ④終了後 24時間持続注入 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | | | | | | |
| ⑥ | ハイドレーション フロセミド注 20mg | 500ml 1A | (側管) 点滴静注 | ↑ | | | | | | | | | | |
| ⑦ | 生理食塩液 フラッシュ | 50ml | (側管) フラッシュ | ↑ | | | | | | | | | | |
| ⑧ | デキサメタゾン錠 4mg | 1日2錠(8mg) | 内服 | ↑ | ↑ | ↑ | | | | | | | | |
| ⑨ | アプレピタントカプセル 80mg (イメンドカプセル) | 1cap | 内服 朝食後 | ↑ | ↑ | | | | | | | | | |

<投与期間> 1日目CDDP、1日目~5日目5-Fu 1日~28日までが1クール
術前は2クール、術後は6クール

<所要時間>

<備考> ハイドレーション初日 3000ml、2日以降 2500ml
セット処方では下記内容を設定。

①ソルデム1号500mL/2時間かけて ×2回

⑤ソルデム1号500mL+ラシックス 20mg1A/2時間かけて

利尿剤投与

<文献> JCOG-8807、9407、9204、9907