

<42>RPMI+Pani 療法

<対象疾患> KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日)							
				1	8	15	22	29	36	43	50
①	生理食塩液 パニツムマブ	100mL 6mg/kg	点滴静注 60分	↑		↑		↑		↑	
②	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デキサメタゾン注 6.6mg	100mL 1 A 1V	点滴静注 30分	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
③	5%ブドウ糖液 レボホリナート(I-LV)	250mL 250mg/m ²	点滴静注 120分	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
④	生理食塩液 フルオロウラシル(5-FU)	50mL 500mg/m ²	③の投与開始 60 分後に側管より 急速静注	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
⑤	生理食塩液	50mL	全開 フラッシュ用	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

<投与期間>

8週間(56日)を1クールとして繰り返す。

RPMIは6週投薬2週休薬(最終投与日の21日後に次クール開始可能)。

ただしパニツムマブは隔週投与。

<所要時間> 約3時間

<備考>