

化学療法レジメン（53 PEM-CBDCA-Bv【肺】）

対象疾患名
非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）

レジメン名
ペメトレキセド/カルボプラチン/ペバシズマブ併用療法
(略名) PEM-CBDCA-Bv

1コースの日数（休薬期間を含む）
_____ 21日

コース数（予定）
4から6コース実施し、以降ペバシズマブ単独またはペメトレキセド+ペバシズマブで継続

No.	薬剤名 (抗がん剤, 輸液, 支持療法を含む) ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 (単位を必ず記入)	投与方法 (静注, 点滴静注, 動脈注射, 側注, 内服 など)	投与時間 (投与速度)	上限量 ※記入必須, ない場合は「なし」と記入	Day																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デカドロン注 6.6mg (デキサメタゾン)	100mL 1A 1V	点滴静注	30分	なし	●																											
2	生理食塩液 アリムタ注射用 (ペメトレキセド)	100mL 500mg/m ²	点滴静注	10分	なし	●																											
3	5%ブドウ糖液 カルボプラチン注	250mL AUC 5~6 (※)	点滴静注	60分	※投与量=AUC × (Cer+25)	●																											
4	生理食塩液 アバスチン注 (ペバシズマブ)	100mL 15mg/kg	点滴静注	初回 90分、問題なければ 2回目 60分、以降 30分に短縮可		●																											
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	フラッシュ		●																											
6	フォリアミン錠 (葉酸)	0.5mg	内服	Day 1の1週間前より連日 最終投与日から 22日目まで継続		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
7	メチコパール注射液 (メコパラミン/VB12)	1mg	筋肉注射	Day 1の1週間前より9週毎																													
8	デカドロン錠 4mg (デキサメタゾン)	1回1錠	内服	1日2回 朝食後			●	●																									