

化学療法レジメン (54 Bv-SOX【大腸】)

対象疾患名

治癒切除不能な進行・再発大腸直腸癌

レジメン名

TS-1/オキサリプラチン/アバスチン療法  
(略名) Bv-SOX

1コースの日数 (休薬期間を含む)

21 日

コース数 (予定)

制限なし コース

No.	薬剤名 (抗がん剤, 輸液, 支持療法を含む) ※商品名と一般名を併記 (一般名は括弧)	標準的投与量 (単位を必ず記入)	投与方法 (静注, 点滴静注, 動脈注射, 側注, 内服 など)	投与時間 (投与速度)	上限量 ※記入必須, ない場合は「なし」と記入	Day																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 アバスチン注 (ベバシズマブ)	100mL 7.5mg/kg	点滴静注	初回 90 分、問題なければ 2 回目 60 分、以降 30 分に短縮可		●																											
2	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デカドロン注 6.6mg (デキサメタゾン)	100mL 1A 1V	点滴静注	30 分	なし	●																											
2	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン点滴静注液	500mL 130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120 分	なし	●																											
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	フラッシュ		●																											
6	ティーエスワン配合 OD 錠 (テカ <sup>®</sup> フォル <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> マラシル/テラシルカリウム) 1.25m <sup>2</sup> 未満 1.25 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 1.5m <sup>2</sup> 以上	80mg/日 100mg/日 120mg/日	経口投与	朝夕食後 14 日間服用 7 日間休薬		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
8	デカドロン錠 4mg (デキサメタゾン)	1 回 1 錠	内服	1 日 2 回 朝食食後			●	●																									