化学療法レジメン（59　Bv-TMZ 注射〔第 1 コース用〕【脳】）

対象疾患名
悪性神経膠腫

レジメン名
アバスチン・テモダール併用療法〔150mg/m²〕
（略名）Bv-TMZ（AVAglio）

1 コースの日数（休薬期間を含む）
28　日

コース数（予定）
6　コース
※第 2 コース以降は 200mg/m²（別レジメンあり）に増量可

No.	薬剤名（抗がん剤，輸液，支持療法を含む）※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量（単位を必ず記入）	投与方法（静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間（投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 アバスチン注（ベバシズマブ）	100mL 10mg/kg	点滴静注	初回 90 分、問題なければ 2 回目 60 分、以降 30 分に短縮可		●														●													
2	生理食塩液 セロトーン注（ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ塩酸塩）	100mL 1A	点滴静注	15 分	なし	●	●	●	●	●																							
3	テモダール点滴静注用（ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ） 注射用水	150mg/m² ※100mg あたり注射用水 41mL を注入し 2.5mg/mL とし、空にした注射用水の容器に必要量を注入）	点滴静注	90 分	なし	●	●	●	●	●																							
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	フラッシュ		●														●													

医療法人橘会　東住吉森本病院