化学療法レジメン（69　SOX【胃】）

対象疾患名
胃癌

レジメン名　S-1＋オキサリプラチン療法
（略名）SOX 療法【胃】

1 コースの日数（休薬期間を含む）
21　日

コース数（予定）
制限なし　コース

No.	薬剤名 （抗がん剤，輸液，支持療法を含む） ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 （単位を必ず記入）	投与方法 （静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間 （投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デカドロン注 6.6mg （デキサメタゾン）	100ml 1 管 1 瓶	点滴静注	30 分	なし	●																				
2	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン点滴静注液	500ml 100mg/m²	点滴静注	120 分	130mg/m²	●																				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開	なし	●																				
4	ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合 OD 錠 （ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ）	80mg/m²	内服 朝夕食後	14 日間服薬 7 日間休薬	80mg/m²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5	デカドロン錠 4mg （デキサメタゾン）	1 回 1 錠	内服	1 日 2 回 朝昼食後			●	●																		

【根拠となる文献・ガイドライン等】

エルプラット点滴静注液 50mg・100mg　添付文書

〔速報〕G-SOX 試験概要および経口フッ化ピリミジン製剤+オキサリプラチン併用療法に関する日本胃癌学会ガイドライン委員会のコメント／日本胃癌学会

治癒切除不能な進行・再発の胃癌の適応でエルプラット点滴静注液をご使用いただく際の留意事項について／株式会社ヤクルト本社

PhaseⅢ study comparing oxaliplatin plus S-1 with cisplatin plus S-1 in chemotherapy-naïve patients with advanced gastric cancer

PhaseⅡ study of adjuvant chemotherapy of S-1 plus oxaliplatin for patients with stageⅢ gastric cancer after D2 gastrectomy

PhaseⅡ study of oxaliplatin plus S-1 as first-line treatment for advanced gastric cancer (G-SOX study)

進行・再発胃癌を対象とした S-1＋cisplatin 対 S-1＋oxaliplatin の第Ⅲ相臨床試験（G-SOX 試験）結果と個別化医療への展開／学会抄録