# 化学療法レジメン（73　Ram-weekly PTX【胃】）

対象疾患名
切除不能進行再発胃癌

レジメン名
Ramucirumab - weeklyPTX 療法
（略名）Ram - weeklyPTX 療法

1コースの日数（休薬期間を含む）
28　日

コース数（予定）
制限なし　コース

| No. | 薬剤名<br>（抗がん剤，輸液，支持療法を含む）<br>※商品名と一般名を併記（一般名は括弧） | 標準的投与量<br>（単位を必ず記入） | 投与方法<br>（静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など） | 投与時間<br>（投与速度） | 上限量<br>※記入必須，ない場合は「なし」と記入 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 生理食塩液<br>デカドロン注 6.6mg<br>（デキサメタゾン）<br>ガスター注射液 20mg<br>（ファモチジン） | 100mL<br>1V<br><br>1A | 点滴静注 | 15 分 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液<br>サイラムザ点滴静注液<br>（ラムシルマブ） | 250mL<br>8mg/kg | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液<br>グラニセトロン注 1mg | 100mL<br>1A | 点滴静注 | (最初の 2 サイクルは 60 分、その後 30 分) | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5%ブドウ糖液<br>パクリタキセル | 250mL<br>80mg/m² | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | フラッシュ | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | レスタミンコーワ錠 10mg<br>（ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩） | 5 錠 | 内服 | No.1 の点滴直前 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

〔注意事項〕※情報源：サイラムザ添付文書

インラインフィルター（0.2 又は 0.22μm）を使用すること。