

化学療法レジメン（75 PE 療法（CDDP+VP-16）【肺】）

対象疾患名 小細胞肺癌	レジメン名 シスプラチン/エトポシド併用療法 (略名) PE 療法 (CDDP/VP-16 療法)	1 コースの日数 (休薬期間を含む) 21~28 日	コース数 (予定) 4 コース
----------------	---	-------------------------------	--------------------

No.	薬剤名 (抗がん剤, 輸液, 支持療法を含む) ※商品名と一般名を併記 (一般名は括弧)	標準的投与量 (単位を必ず記入)	投与方法 (静注, 点滴静注, 動脈注射, 側注, 内服 など)	投与時間 (投与速度)	上限量 ※記入必須, ない場合は「なし」と記入	Day																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	500mL	点滴静注	90分	なし	●	●	●																									
2	生理食塩液 アロキシ静注 0.75mg (パロセトン) デカドロン注 6.6mg (デキサメタゾン)	100mL 1 瓶 1.5 瓶	点滴静注	30分	なし	●																											
3	生理食塩液 デカドロン注 6.6mg (デキサメタゾン)	100mL 1.5 瓶	点滴静注	30分	なし		●	●																									
4	5%ブドウ糖液 ラステット注 (エトポシド)	250mL 100mg/m ²	点滴静注	90分	なし	●	●	●																									
5	ラクテック注 硫酸 Mg 補正液 (硫酸マグネシウム)	500mL 8mL (0.4 管)	点滴静注	90分		●																											
6	20%マンニトール注射液	300mL (1 本)	点滴静注	90分		●																											
7	生理食塩液 シスプラチン注	500mL 80 mg/m ²	点滴静注	120分		●																											
8	生理食塩液	500ml	点滴静注	90分		●																											
9	ラクテック注	500mL	点滴静注	90分			●	●																									
10	イメンドカプセル (アプレピタント)	125mg	内服	朝食後 (Rp1 前)		●																											
11	イメンドカプセル (アプレピタント)	80mg	内服	朝食後 (Rp1 前)			●	●																									

【注意事項】

十分な尿量確保が必要なため、飲水を励行するよう促すこと

1 日尿量が 1L 以下の場合、①~③の投与を考慮すること / ①ソルデム 3A 輸液 500mL 等の補液 / ②20%マンニトール注射液 300mL / ③フロセミド注射液