化学療法レジメン（77　PEM+CDDP【肺】）

対象疾患名
　悪性胸膜中皮腫
（malignant pleural mesotheliomia：MPM）

申請レジメン名
　ペメトレキセド・シスプラチン併用療法
（略名）PEM+CDDP

1コースの日数（休薬期間を含む）
21　日

コース数（予定）
6コース

No.	薬剤名 （抗がん剤，輸液，支持療法を含む） ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 （単位を必ず記入）	投与方法 （静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間 （投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day																										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	500mL	点滴静注	60分	なし	●																										
2	ラクテック注 フロセミド注20mg	500mL 1管	点滴静注	60分	なし	●																										
3	ソルデム3A輸液	500mL	点滴静注	60分	なし	●																										
4	生理食塩液 硫酸Mg補正液（硫酸マグネシウム）	500mL 0.4管（8mL）	点滴静注	60分	なし	●																										
5	生理食塩液 アロキシ静注0.75mg（ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ） デカドロン注6.6mg（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ）	50mL 1瓶 1.5瓶（9.9mg）	点滴静注	30分	なし	●																										
6	生理食塩液 アリムタ注（ペメトレキセド）	100mL 500mg/ m^2	点滴静注	10分	なし	●																										
7	KN3号輸液	200mL	点滴静注	30分	なし	●																										
8	生理食塩液 シスプラチン注	1000mL 75 mg/m^2	点滴静注	120分	なし	●																										
9	生理食塩液	500ml	点滴静注	60分	なし	●																										
10	ラクテック注 フロセミド注20mg	500mL 1管	点滴静注	60分	なし	●																										
11	20%マンニットール注射液	300mL	点滴静注	60分	なし	●																										

12	ソルデム 3A 輸液	500mL	点滴静注	60 分	なし	●																												
13	イメンドカプセル（アプレピタント）	125mg	内服	Rp6 の 60～90 分前	なし	●																												
14	イメンドカプセル（アプレピタント）	80mg	内服	朝食後	なし		●	●																										
15	デカドロン錠 4mg	1 日 2 錠 (例)2 錠分 2	内服	(例) 朝昼食後	なし		●	●	●																									
16	フォリアミン錠（葉酸）	0.1 錠（0.5mg）	内服	Day 1 の 1 週間前より連日 最終投与日から 22 日目まで継続		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
17	メチコバール注射液 （メコバラミン/VB12）	2 管（1mg）	筋肉注射	Day 1 の 1 週間前より 9 週毎																														

〔注意事項〕

十分な尿量確保が必要なため、飲水を励行するよう促すこと。

点滴投与日を含め前後 2 日間は NSAIDs の使用を控えること（アセトアミノフェン製剤は使用可）。

医療法人橘会　東住吉森本病院