化学療法レジメン（80　SIRB 療法（IRIS-Bv 療法）【大腸】）

対象疾患名
治癒切除不能な進行・再発大腸癌

レジメン名
TS-1・イリノテカン・ベバシズマブ併用療法
（略名）SIRB 療法（IRIS + Bv）

1コースの日数（休薬期間を含む）
21　日

コース数（予定）
制限なし　コース

No.	薬剤名 （抗がん剤，輸液，支持療法を含む） ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 （単位を必ず記入）	投与方法 （静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間 （投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 アバスチン注（ベバシズマブ）	100mL 7.5mg/kg	点滴静注	初回 90 分、問題なければ 2 回目 60 分、以降 30 分に短縮可		●																											
2	生理食塩液	100mL	点滴静注	30 分	なし	●																											
3	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デカドロン注 6.6mg（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ）	100mL 1 筒 1 瓶	点滴静注	30 分	なし	●																											
4	生理食塩液 イリノテカン注	500mL 150mg/m²	点滴静注	90 分	なし	●																											
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	フラッシュ	なし	●																											
6	ティーエスワン配合 OD 錠 （ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ）	80mg/ m²	内服	2 週内服・ 1 週休薬	なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
7	デカドロン錠 4mg （デキサメタゾン）	1 日 2 錠	内服	（用法例） 分 1　朝食後 分2　朝昼食後	なし		●	●																									