化学療法レジメン（86　ニボルマブ【胃】）

対象疾患名
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発胃癌

レジメン名
（略名）ニボルマブ【胃】

1コースの日数（休薬期間を含む）
14　日

コース数（予定）
PD 判定 2 回目まで

No.	薬剤名（抗がん剤，輸液，支持療法を含む）※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量（単位を必ず記入）	投与方法（静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間（投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 オプジーボ点滴静注 （ニボルマブ）	100ml 240mg	点滴静注	30 分		●																									
2	生理食塩液	50ml	点滴静注	ﾌﾗｯｼｭ		●																									

〔注意事項〕※情報源：オプジーボ添付文書、小野薬品工業 MR

- インラインフィルター（0.2 又は 0.22 μm）を使用すること。
- 化学療法未治療患者における有効性及び安全性は確立していない。
- 術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。
- 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
- 総液量は 60mL 以上を目安とする。希釈後の最終濃度 0.35mg/mL 未満では本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。
- 効果判定の推奨期間は 8~10 週、2 回目以降は 6 週ごと。効果発現時期がおおよそ 2 ヶ月以降であり、1 回目の効果判定で PD であっても 2 回目 PD までは投与継続を推奨。