化学療法レジメン（90　CDDP＋PEM＋Bv【肺】）

対象疾患名
非小細胞肺癌（非扁平上皮）

レジメン名
シスプラチン/ペメトレキセド/ベバシズマブ併用療法

（略名）CDDP＋PEM＋Bv 併用療法

1コースの日数（休薬期間を含む）
21　日

コース数（予定）
4～6 コース実施
以降ペメトレキセド＋ベバシズマブで維持投与

No.	薬剤名 （抗がん剤，輸液，支持療法を含む） ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 （単位を必ず記入）	投与方法 （静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など）	投与時間 （投与速度）	上限量 ※記入必須，ない場合は「なし」と記入	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ラクテック注	500mL	点滴静注	90 分	なし	●																											
2	生理食塩液 アロキシ静注 0.75mg（ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ） デカドロン注 6.6mg（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ）	100mL 1 瓶 1.5 瓶	点滴静注	30 分	なし	●																											
3	生理食塩液 アリムタ注（ペメトレキセド）	100mL 500mg/m²	点滴静注	10 分	なし	●																											
4	ラクテック注 硫酸 Mg 補正液（硫酸マグネシウム）	500mL 8mL（0.4 管）	点滴静注	90 分	なし	●																											
5	20%マンニットール注射液	300mL（1 本）	点滴静注	90 分	なし	●																											
6	生理食塩液 シスプラチン注	500mL 75mg/m²	点滴静注	120 分	なし	●																											
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	全開		●																											
8	生理食塩液 アバスチン注（ベバシズマブ）	100mL 15mg/kg	点滴静注	初回 90 分、忍容性に問題なければ 2 回目 60 分、以降 30 分に短縮可		●																											
9	生理食塩液	500ml	点滴静注	90 分	なし	●																											
10	生理食塩液	500mL	点滴静注	90 分	なし	●																											
11	イメンドカプセル（アプレピタント）	125mg	内服	朝食後（Rp1 前）	なし	●																											
12	イメンドカプセル（アプレピタント）	80mg	内服	朝食後	なし		●	●																									
13	デカドロン錠（デキサメタゾン）	8mg（2 錠）	内服	朝昼食後	なし		●	●																									
14	フォリアミン錠（葉酸）	0.1 錠（0.5mg）	内服	Day1 の 1 週間前より連日 最終投与日から 22 日目まで継続		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							

15	メチコバール注射液 （メコバラミン/VB12）	2 管（1mg）	筋肉注射	Day1 の 1 週間前より 9 週毎																												

〔注意事項〕

- Day1～3 の間は尿量測定を実施すること。
- 十分な尿量確保が必要なため、飲水を励行するよう促すこと
- 1 日尿量が 1L 以下の場合、①～③の投与を考慮すること／①ソルデム 3A 輸液 500mL 等の補液／②20%マンニットール注射液 300mL／③フロセミド注射液